

四次元空間のラプラシアン の極座標表示 ～角運動量演算子との関係～

adhara*

2017年4月1日

1 四次元空間のラプラシアン の極座標表示

1.1 四次元空間のラプラシアン

ラプラシアンは、

$$\Delta_{\mathbf{R}^4} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{\partial^2}{\partial w^2} \quad (1)$$

(x, y, z, w) はデカルト座標表示である。

1.2 四次元空間の極座標表示

四次元空間の極座標表示 $(r, \alpha, \theta, \phi)$ を導入する。すなわち、

$$(x, y, z, w) = (r \sin \alpha \sin \theta \cos \phi, r \sin \alpha \sin \theta \sin \phi, r \sin \alpha \cos \theta, r \cos \alpha) \quad (2)$$

とする。ただし、 $r > 0$, $0 \leq \alpha < \pi$, $0 \leq \theta < \pi$, $0 \leq \phi < 2\pi$ である。

このとき座標の逆変換の式は

$$\begin{pmatrix} r \\ \alpha \\ \theta \\ \phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + w^2} \\ \arccos \left(\frac{w}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + w^2}} \right) \\ \arccos \left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) \\ \arctan \left(\frac{y}{x} \right) + \frac{1 - \text{sgn}(y)}{2} \pi \end{pmatrix} \quad (3)$$

となる。

* [Twitter @adhara_mathphys](https://twitter.com/adhara_mathphys)

1.3 四次元空間のラプラシアン極座標表示

直交曲線座標におけるラプラシアン表示式を用いると、

$$\Delta_{R^4} = \frac{1}{r^3} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^3 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{\Delta_{S^3}}{r^2} \quad (4)$$

となる。ここで、

$$\Delta_{S^3} = \frac{1}{\sin^2 \alpha \sin \theta} \left\{ \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\sin^2 \alpha \sin \theta \frac{\partial}{\partial \alpha} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial \phi} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \right\} \quad (5)$$

である。新たに導入された Δ_{S^3} は四次元空間内の単位超球面 S^3 上のラプラシアンであり、Laplace-Beltrami 演算子とも呼ばれる。

2 四次元空間における角運動量演算子の球座標表示

2.1 四次元空間における角運動量演算子

四次元空間においては独立な角運動量演算子が6個存在する。例えば、

$$L_x = yp_z - zp_y, \quad L_y = zp_x - xp_z, \quad L_z = xp_y - yp_x \quad (6)$$

$$M_x = xp_w - wp_x, \quad M_y = yp_w - wp_y, \quad M_z = zp_w - wp_z \quad (7)$$

で定義される角運動量演算子は独立なものである。

角運動量演算子の間には交換関係

$$[L_i, L_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} L_k \quad (8)$$

$$[M_i, L_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} M_k \quad (9)$$

$$[M_i, M_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} L_k \quad (10)$$

が成立する。(アインシュタインの縮約を用いた。) これらは $so(4)$ 代数の基底を成しており、 $SO(4)$ 群を生成する働きを持つ。

2.2 直交性

三次元ベクトル演算子 $\mathbf{L} = (L_x, L_y, L_z)$, $\mathbf{M} = (M_x, M_y, M_z)$ を定義する。簡単な計算により

$$\mathbf{M} \cdot \mathbf{L} = \mathbf{L} \cdot \mathbf{M} = 0 \quad (11)$$

が成立することがわかる。実は $\mathbf{M} \cdot \mathbf{L}$ は $so(4)$ 代数における独立な2つのカシミール演算子のうちの1つ(もう一つは $\mathbf{M}^2 + \mathbf{L}^2$) なのだが、消えてしまうことが分かる。

2.3 角運動量演算子の球座標表示

よく使う微分として、

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

がある。これらを用いると、

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial}{\partial x}\right)_{y,z,w} &= \frac{x}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r}\right)_{\alpha,\theta,\phi} + \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{w}{r}\right)^2}} \frac{xw}{r^3} \left(\frac{\partial}{\partial \alpha}\right)_{r,\theta,\phi} \\ &+ \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{z}{r \sin \alpha}\right)^2}} \frac{xz}{(r \sin \alpha)^3} \left(\frac{\partial}{\partial \theta}\right)_{r,\alpha,\phi} - \frac{y}{x^2+y^2} \left(\frac{\partial}{\partial \phi}\right)_{r,\alpha,\theta} \end{aligned} \quad (12)$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial}{\partial y}\right)_{x,z,w} &= \frac{y}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r}\right)_{\alpha,\theta,\phi} + \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{w}{r}\right)^2}} \frac{yw}{r^3} \left(\frac{\partial}{\partial \alpha}\right)_{r,\theta,\phi} \\ &+ \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{z}{r \sin \alpha}\right)^2}} \frac{yz}{(r \sin \alpha)^3} \left(\frac{\partial}{\partial \theta}\right)_{r,\alpha,\phi} + \frac{x}{x^2+y^2} \left(\frac{\partial}{\partial \phi}\right)_{r,\alpha,\theta} \end{aligned} \quad (13)$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial}{\partial z}\right)_{x,y,w} &= \frac{z}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r}\right)_{\alpha,\theta,\phi} + \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{w}{r}\right)^2}} \frac{zw}{r^3} \left(\frac{\partial}{\partial \alpha}\right)_{r,\theta,\phi} \\ &+ \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{z}{r \sin \alpha}\right)^2}} \left(\frac{z^2}{(r \sin \alpha)^3} - \frac{1}{r \sin \alpha}\right) \left(\frac{\partial}{\partial \theta}\right)_{r,\alpha,\phi} \end{aligned} \quad (14)$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial w}\right)_{x,y,z} = \frac{w}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r}\right)_{\alpha,\theta,\phi} + \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{w}{r}\right)^2}} \left(\frac{w^2}{r^3} - \frac{1}{r}\right) \left(\frac{\partial}{\partial \alpha}\right)_{r,\theta,\phi} \quad (15)$$

となる。

式 2、式 12-15 を用いると、

$$L_x = \frac{\hbar}{i} \left\{ -\sin \phi \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\cos \phi \cos \theta}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right\} \quad (16)$$

$$L_y = \frac{\hbar}{i} \left\{ \cos \phi \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\sin \phi \cos \theta}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right\} \quad (17)$$

$$L_z = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \phi} \quad (18)$$

$$M_x = \frac{\hbar}{i} \left\{ -\sin \theta \cos \phi \frac{\partial}{\partial \alpha} - \frac{\cos \alpha \cos \theta \cos \phi}{\sin \alpha} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\cos \alpha \sin \phi}{\sin \alpha \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right\} \quad (19)$$

$$M_y = \frac{\hbar}{i} \left\{ -\sin \theta \sin \phi \frac{\partial}{\partial \alpha} - \frac{\cos \alpha \cos \theta \sin \phi}{\sin \alpha} \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\cos \alpha \cos \phi}{\sin \alpha \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right\} \quad (20)$$

$$M_z = \frac{\hbar}{i} \left\{ -\cos \theta \frac{\partial}{\partial \alpha} + \frac{\cos \alpha \sin \theta}{\sin \alpha} \frac{\partial}{\partial \theta} \right\} \quad (21)$$

となる。

それぞれの二乗の演算子を極座標表示する。 L_i^2 については少々計算により、

$$L_x^2 = -\hbar^2 \left\{ \sin^2 \phi \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cos^2 \phi \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + 2 \sin \phi \cos \phi \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{\partial^2}{\partial \theta \partial \phi} \right. \\ \left. - \frac{\sin \phi \cos \phi}{\sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} + \cos^2 \phi \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \right\} \quad (22)$$

$$L_y^2 = -\hbar^2 \left\{ \cos^2 \phi \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \sin^2 \phi \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} - 2 \sin \phi \cos \phi \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{\partial^2}{\partial \theta \partial \phi} \right. \\ \left. + \frac{\sin \phi \cos \phi}{\sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} + \sin^2 \phi \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \right\} \quad (23)$$

$$L_z^2 = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \quad (24)$$

となる。

M_i^2 については少々長いが、

$$M_x^2 = -\hbar^2 \left\{ \sin^2 \theta \cos^2 \phi \frac{\partial^2}{\partial \alpha^2} + \left(\frac{\cos \alpha \cos \theta \cos \phi}{\sin \alpha} \right)^2 \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \left(\frac{\cos \alpha \sin \phi}{\sin \alpha \sin \theta} \right)^2 \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right. \\ + 2 \sin \theta \cos \theta \cos^2 \phi \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \frac{\partial^2}{\partial \theta \partial \alpha} - \frac{\sin \theta \cos \theta \cos^2 \phi}{\sin^2 \alpha} \frac{\partial}{\partial \theta} + \cos^2 \theta \cos^2 \phi \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \frac{\partial}{\partial \alpha} \\ - 2 \sin \phi \cos \phi \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \frac{\partial^2}{\partial \phi \partial \alpha} + \frac{\sin \phi \cos \phi}{\sin^2 \alpha} \frac{\partial}{\partial \phi} + \sin^2 \phi \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \frac{\partial}{\partial \alpha} \\ \left. - 2 \frac{\cos^2 \alpha \cos \theta \sin \phi \cos \phi}{\sin^2 \alpha \sin \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi \partial \theta} + \frac{\cos^2 \alpha \cos \theta \sin^2 \phi}{\sin^2 \alpha \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\cos^2 \alpha \cos^2 \theta \sin \phi \cos \phi}{\sin^2 \alpha \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right\} \quad (25)$$

$$M_y^2 = -\hbar^2 \left\{ \sin^2 \theta \sin^2 \phi \frac{\partial^2}{\partial \alpha^2} + \left(\frac{\cos \alpha \cos \theta \sin \phi}{\sin \alpha} \right)^2 \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \left(\frac{\cos \alpha \cos \phi}{\sin \alpha \sin \theta} \right)^2 \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right. \\ + 2 \sin \theta \cos \theta \sin^2 \phi \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \frac{\partial^2}{\partial \theta \partial \alpha} - \frac{\sin \theta \cos \theta \sin^2 \phi}{\sin^2 \alpha} \frac{\partial}{\partial \theta} + \cos^2 \theta \sin^2 \phi \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \frac{\partial}{\partial \alpha} \\ + 2 \sin \phi \cos \phi \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \frac{\partial^2}{\partial \phi \partial \alpha} - \frac{\sin \phi \cos \phi}{\sin^2 \alpha} \frac{\partial}{\partial \phi} + \cos^2 \phi \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \frac{\partial}{\partial \alpha} \\ \left. + 2 \frac{\cos^2 \alpha \cos \theta \sin \phi \cos \phi}{\sin^2 \alpha \sin \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi \partial \theta} + \frac{\cos^2 \alpha \cos \theta \cos^2 \phi}{\sin^2 \alpha \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\cos^2 \alpha \cos^2 \theta \sin \phi \cos \phi}{\sin^2 \alpha \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right\} \quad (26)$$

$$M_z^2 = -\hbar^2 \left\{ \cos^2 \theta \frac{\partial^2}{\partial \alpha^2} + \sin^2 \theta \left(\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \right)^2 \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} - 2 \sin \theta \cos \theta \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \frac{\partial^2}{\partial \theta \partial \alpha} \right. \\ \left. + \sin^2 \theta \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \frac{\partial}{\partial \alpha} + \frac{\sin \theta \cos \theta}{\sin^2 \alpha} \frac{\partial}{\partial \theta} \right\} \quad (27)$$

となる。

したがって L , M の二乗の演算子、 L^2 , M^2 はそれぞれ

$$L^2 = -\hbar^2 \left\{ \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \right\} \quad (28)$$

$$M^2 = -\hbar^2 \left\{ \frac{\partial^2}{\partial \alpha^2} + \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + \frac{\cos^2 \alpha \cos \theta}{\sin^2 \alpha \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} + 2 \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \frac{\partial}{\partial \alpha} \right\} \quad (29)$$

のように計算される。

3 超球面上ラプラシアン of 角運動量演算子による表示

超球面 S^3 上のラプラシアン

$$\Delta_{S^3} = \frac{1}{\sin^2 \alpha \sin \theta} \left\{ \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\sin^2 \alpha \sin \theta \frac{\partial}{\partial \alpha} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial \phi} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \right\} \quad (30)$$

と、

$$\begin{aligned} L^2 + M^2 &= -\hbar^2 \left\{ \frac{\partial^2}{\partial \alpha^2} + \frac{1}{\sin^2 \alpha} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{1}{\sin^2 \alpha \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + \frac{\cos \theta}{\sin^2 \alpha \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} + 2 \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \frac{\partial}{\partial \alpha} \right\} \\ &= -\hbar^2 \frac{1}{\sin^2 \alpha \sin \theta} \left\{ \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\sin^2 \alpha \sin \theta \frac{\partial}{\partial \alpha} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial \phi} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \right\} \end{aligned} \quad (31)$$

を見比べると、

$$\Delta_{S^3} = -\frac{L^2 + M^2}{\hbar^2} \quad (32)$$

がわかる。したがって、

$$\Delta_{R^4} = \frac{1}{r^3} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^3 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{L^2 + M^2}{\hbar^2 r^2} \quad (33)$$

と書ける。

実は $L^2 + M^2$ は $so(4)$ 代数の独立な 2 つのカシミール演算子のもう一つのものである。(もう一つは $M \cdot L$)